

器具別消毒方法

区分	種類	時間	留意点	備考
かみそり (頭髪専用を除く) 血液が付着した器具 (疑い含む)	煮沸 (100℃)	沸騰後 2分間以上	①加熱により変形するものがある 適：陶磁器、金属、線維性の器具 不適：合成樹脂製器具(くし等) ②水量を適正に維持。	さび止めの目的で亜硝酸ナトリウム等を添加できる
	エタノール (浸漬)	10分間以上	①消毒用エタノール(76.9v/v%～81.4v/v%)を希釈せずに使用すること。 ②蒸発、汚れの程度により7日以内に交換。	無水エタノールを使用する際は、消毒用エタノールと同等の濃度に希釈すること。
	次亜塩素酸ナトリウム (0.1%)	10分間以上	①金属器具、動物性繊維製品は腐食することがあるので、浸漬時間に注意 ②消毒液は毎日交換。 ③塩素濃度の低下に注意。	取扱い時には、ゴム手袋を着用することが望ましい。
血液付着の疑いがない器具 〔かみそり (頭髪専用) ハサミ コーム 等〕	上記の方法と同様の方法			
	紫外線 (85μw/cm ²)	20分間以上	①不適：ブラシ(構造が複雑で、紫外線の照射を受けにくい構造の器具) ②適宜、紫外線灯の取替えが必要。 ③定期的に紫外線灯、照射版の清掃が必要。	
	蒸し器 (80℃以上)	10分間以上	①加熱により変形するものがある。 適：ガラス、陶磁器、金属、線維性の器具 不適：合成樹脂製器具(くし等) ②湿熱が充分伝わるように、蒸し器内での配置に留意。 ③器内底の水量を適量に維持。	
	エタノール (清拭)	消毒用エタノールを含ませた綿、ガーゼで表面をふく。		消毒用エタノールは希釈しないで使用
	次亜塩素酸ナトリウム (0.01%～0.1%)	10分間以上		
	逆性石ケン液 (0.1%～0.2%)	10分間以上	①洗浄剤を充分水洗いしてから、使用すること。 ②消毒液は毎日交換。	別名： 塩化ベンザルニウム 塩化ベンゾトニウム
	グルコン酸クロルヘキシジン (0.05%)	10分間以上	消毒液は毎日交換。	
	両性界面活性剤 (0.1%～0.2%)	10分間以上	消毒液は毎日交換。	別名： 塩酸アルキル [®] リアミ [®] エチル [®] リン 塩酸アルキル [®] アミ [®] エチル [®] リン
	蒸し器 (80℃以上)	10分間以上	①湿熱が充分伝わるように、蒸し器内での配置に留意。 ②器内底の水量を適量に維持。	血液が付着した場合は、廃棄するか、血液が付着している器具と同様の洗浄、消毒を行う。
タオル、布片類	次亜塩素酸ナトリウム (0.01%～0.1%)	10分間以上	消毒後は、洗濯、乾燥し保管、又は蒸し器で保管。	
その他の器具	間接的に皮膚に接する器具 (シェービングカップ等)		材質に応じて、上記の方法で消毒	
	施設、毛髪箱、汚物箱		適宜、消毒。	