

感染性胃腸炎チェックリスト（保育施設用）

施設名

- 「調査時に不備のあった項目」については早急に対応してください。
- 感染拡大防止のため、施設の全職員がこのチェックリストで定期的にチェックを行い、「十分とは言えない項目」に該当があれば、早急に対応してください。
- このチェックリストは保育日誌などと一緒に保管してください。

施設職員チェック実施日 令和 年 月 日 実施者:

	施設職員	チェック項目		
感染拡大の防止	☐	事前準備	嘔吐物処理用具を事前に準備しているか (使い捨て手袋・エプロン・マスク・消毒薬・ペーパータオル・ビニール袋など)	
	☐		下痢便処理用具を事前に準備しているか (使い捨て手袋・エプロン・マスク・防水シート・消毒薬・ペーパータオル・ビニール袋など)	
	☐		消毒薬は使用期限を確認し、希釈後は毎日交換しているか。	
	☐	手洗い	園児	流水と石けんによる手洗いを30秒以上行っているか
	☐		職員	流水と石けんによる手洗いを30秒以上行っているか
	☐	手洗い後	園児	ペーパータオル又は個人タオルを使用し、共有はないか
	☐		職員	ペーパータオル又は個人タオルを使用し、共有はないか
	☐	環境消毒	トイレの便座、ドアノブ、手すり、床など、園児及び職員が頻繁に触れる物・場所を1日に1回以上、0.02%次亜塩素酸ナトリウム希釈液で消毒しているか	
	☐	エリア分け	園児の症状が出現した際には、お迎えまで別室で休ませているか	
☐	発症者・非発症者のトイレ・おむつ交換場所をエリア分けしているか (胃腸炎症状がなくなった後も、3週間ほどウイルスを排出している可能性がある)			
嘔吐物の処理	☐	処理	①他の園児を別室などに移動し②換気③嘔吐した園児への対応者と嘔吐物処理者を分け④使い捨て手袋・エプロン・マスクを装着のうえ対応しているか	
	☐		嘔吐物を取り除いた後、周囲半径2m以上の床・壁・物品等を0.1%次亜塩素酸ナトリウム希釈液で消毒しているか	
	☐	処理後	嘔吐物処理後、手袋を外した後も手洗いを30秒以上実施しているか	
	☐		嘔吐物が付着した衣類などは、ビニール袋に入れて口を閉じ、園児が触れない場所に置いているか	
下痢便の処理	☐	処理	①換気②使い捨て手袋・エプロン・マスクを装着のうえ対応しているか	
	☐		オムツ交換の際、①換気②使い捨て手袋・エプロン・マスクを装着のうえ③使い捨て防水シートを敷いて交換④交換後は0.1%次亜塩素酸ナトリウム希釈液で交換場所を消毒しているか	
	☐	処理後	下痢便処理後、手袋を外した後に手洗いを30秒以上実施しているか	
	☐		下痢便が付着した衣類や使用済みおむつなどは、ビニール袋に入れて口を閉じ、園児が触れない場所に置いているか	
情報の共有	☐	発生について職員に周知し、有症状時はすみやかに受診すること及び施設内感染対策を共有しているか		
	☐	発生について保護者に周知し、有症状時はすみやかに受診するよう保護者に伝えているか		
	☐	年に1回は、職員全員で嘔吐物及び下痢便の処理手順を確認しているか		

その他