

肝臓の機能障害の状態及び所見

1 肝臓機能障害の重症度

	検査日（第1回）		検査日（第2回）	
	平成〇〇年〇月〇日		平成××年×月×日	
	状態	点数	状態	点数
肝性脳症	なし・ <u>I</u> ・II III・IV・V	2	なし・ <u>I</u> ・II III・IV・V	2
腹水	<u>なし</u> ・軽度 中程度以上 概ね 0	1	<u>なし</u> ・軽度 中程度以上 概ね 0	1
血清アルブミン値	2.2 g/dℓ	3	2.4 g/dℓ	3
プロトロンビン時間	50 %	2	45 %	2
血清総ビリルビン値	5.3 mg/dℓ	3	5.5 mg/dℓ	3

合計点数	11点	11点
(○で囲む)	5～6点・7～9点・ <u>10点以上</u>	5～6点・7～9点・ <u>10点以上</u>
肝性脳症又は腹水の項目を 含む3項目以上における 2点以上の有無	<u>有</u> ・無	<u>有</u> ・無

注1 90日以上180日以内の間隔において実施した連続する2回の診断・検査結果を記入すること。

注2 点数は、Child-Pugh分類による点数を記入すること。

<Child-Pugh分類>

	1点	2点	3点
肝性脳症	なし	軽度（I・II）	昏睡（III以上）
腹水	なし	軽度	中程度以上
血清アルブミン値	3.5g/dℓ超	2.8～3.5g/dℓ	2.8g/dℓ未満
プロトロンビン時間	70%超	40～70%	40%未満
血清総ビリルビン値	2.0mg/dℓ未満	2.0～3.0mg/dℓ	3.0mg/dℓ超

注3 肝性脳症の昏睡度分類は、犬山シンポジウム（1981年）による。

注4 腹水は、原則として超音波検査、体重の増減、穿刺による排出量を勘案して見込まれる量が概ね10以上を軽度、30以上を中程度以上とするが、小児等の体重が概ね40kg以下の者については、薬剤によるコントロールが可能なものを軽度、薬剤によってコントロールできないものを中程度以上とする。

2 障害の変動に関する因子

	第1回検査	第2回検査
180日以上アルコールを 摂取していない	<u>○</u> ・×	<u>○</u> ・×
改善の可能性のある 積極的治療を実施	<u>○</u> ・×	<u>○</u> ・×

3 肝臓移植

肝臓移植の実施	有・ <u>無</u>	実施年月日	年 月 日
抗免疫療法の実施	有・ <u>無</u>		

注5 肝臓移植を行った者であって、抗免疫療法を実施している者は、1、2、4の記載は省略可能である。

4 補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴、日常生活活動の制限

補完的な肝機能診断	血清総ビリルビン値5.0mg/dl以上		☒ 有・無
	検査日	平成××年×月×日	
	血中アンモニア濃度150 μ g/dl以上		☒ 有・無
	検査日	平成××年×月×日	
症状に影響する病歴	血小板数50,000/mm ³ 以下		☒ 有・無
	検査日	平成××年×月×日	
	原発性肝がん治療の既往		有・ ☒ 無
	確定診断日	年 月 日	
	特発性細菌性腹膜炎治療の既往		有・ ☒ 無
	確定診断日	年 月 日	
	胃食道静脈瘤治療の既往		有・ ☒ 無
	確定診断日	年 月 日	
日常生活活動の制限	現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染		有・ ☒ 無
	最終確認日	年 月 日	
	1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上ある		☒ 有・無
	1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある		☒ 有・無
	有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある		有・ ☒ 無

該当個数	5個
補完的な肝機能診断又は症状に影響する病歴の有無	☒ 有・無