

第6節 周産期死亡統計

表6－1 周産期死亡数、区別

平成29年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)	周 産 期 死 亡 中 妊娠満22週以後の 死産の占める割合 (%)
	総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数				
千葉市	27	23	4	4.0	3.4	0.6	85.2
中央区	6	6	－	3.5	3.5	－	100.0
花見川区	－	－	－	－	－	－	－
稲毛区	2	2	－	1.7	1.7	－	100.0
若葉区	7	5	2	7.4	5.3	2.1	71.4
緑 区	8	6	2	7.6	5.7	1.9	75.0
美浜区	4	4	－	4.8	4.8	－	100.0

注:1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

表6-2 周産期死亡数、死因(児側病態)別

平成29年

		周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
		総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数		27	23	4	4.0	3.4	0.6
X VI	周産期に発生した病態(P00-P04除く)	23	20	3	3.4	3.0	0.5
P05-P08	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	1	1	0.3	0.2	0.2
P10-P15	出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	0.3	0.2	0.2
P35-P39	周産期に特異的な感染症	1	-	1	0.2	-	0.2
P50-P61	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P74	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P75-P78	胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P90-P96	周産期に発生したその他の障害	18	18	-	2.7	2.7	-
X VII	先天奇形、変形及び染色体異常	4	3	1	0.6	0.5	0.2
Q00-Q07	神経系の先天奇形	1	1	-	0.2	0.2	-
Q10-Q18	眼、耳、顔面及び頭部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	循環器系の先天奇形	1	1	-	0.2	0.2	-
Q30-Q34	呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37	唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56	性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	尿路系の先天奇形	1	-	1	0.2	-	0.2
Q65-Q79	筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	その他の先天奇形	1	1	-	0.2	0.2	-
Q90-Q99	染色体異常、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
I	感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II	新生物	-	-	-	-	-	-
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV	内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-
V	精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI	神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX	循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X	呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I	消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II	皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III	筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV	泌尿器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X	傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産