

麻しん（はしか）の発生について

千葉市在住の40代の男性が麻しんと診断され、市内医療機関から千葉市保健所に麻しんの発生届の提出がありました。

千葉市保健所で調査をした結果、他の人に麻しんを感染させてしまう可能性がある期間（感染可能期間）に、不特定多数の方が利用する公共交通機関等を利用していたことが判明しましたので、お知らせします。

1 患者の概要

（1）年代、性別

40代、男性

（2）症状

倦怠感、発熱、咳、咽頭痛、発しん

（3）ワクチン接種歴

不明

2 経過

令和7年6月22日（日） 倦怠感出現（発症）

23日（月） 発熱、咽頭痛

24日（火） 市内医療機関Aを受診

26日（木） 発しん症状出現

27日（金） 市内医療機関Aを受診

検体（血液、尿、咽頭ぬぐい）採取

28日（土） 千葉市環境保健研究所の遺伝子検査において麻しん陽性と判明。市内医療機関Aより麻しんの発生届（確定診断例）の提出。

※現在は自宅療養中で快方に向かっている（6月28日に解熱）

3 感染可能期間（発症日前日の6月21日以降）に患者が利用した、不特定多数の方が利用する公共交通機関・施設等

次の公共交通機関等を同じ時間帯に利用された方で、利用後21日以内（特に10日前後）に発熱や発しん等、麻しんを疑うような症状が現れた場合は、事前に最寄りの保健所に電話連絡し、指示に従い医療機関を受診してください。

○麻しん患者が利用し、不特定多数の方と接触した可能性のある交通機関等

利用日	時間帯	利用公共交通機関、利用区間、利用施設等
6月21日 (土)	16:00～ 17:00頃	コープ東寺山店 DAISO コープ千葉東寺山店 (千葉市若葉区東寺山町422-1)
	17:30～ 18:00頃	スシロー若葉桜木店 (千葉市若葉区若松町2138-42)
6月22日 (日)	10:30～ 11:30頃	キャッツアイ東千葉店 (千葉市中央区祐光3-2-1)
	11:30～ 12:00頃	オーケー千葉中央店 (千葉市中央区祐光3-8-18) ダイワサイクル東千葉店 (千葉市中央区祐光3-1)
	13:00～ 14:00頃	イオンタウンおゆみ野 (千葉市緑区おゆみ野南5-37-1)
6月23日 (月)	8:40～ 8:50頃	千葉都市モノレール 小倉台駅～都賀駅
	8:50～ 9:00頃	JR総武本線 都賀駅～千葉駅
	9:00～ 9:50頃	JR総武快速線 千葉駅～馬喰町駅
	9:50～ 10:00頃	セブンイレブン千代田岩本町2丁目店 (東京都千代田区岩本町2丁目18-1)
	19:10～ 20:00頃	JR総武快速線 馬喰町駅～千葉駅 JR総武本線 千葉駅～都賀駅
	20:00～ 20:30頃	千葉都市モノレール 都賀駅～小倉台駅

※接触者が特定できておらず、不特定多数の接触者がいる可能性がある施設等については、広く情報提供するため、施設名等を公表しています。

※接触者が特定できる施設（医療機関等）については、保健所が接触者の健康観察を実施しています。

※施設へのお問い合わせはご遠慮ください。現時点において、麻しん患者が利用した施設等を利用しても心配はありません。

※医療機関を受診する際は、周囲の方への感染を広げないように、マスクを着用し、公共交通機関等の利用を避けてください。

4 麻疹発生届出件数（件）

年（１－１２月）	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年
千葉市 (令和7年6月28日現在)	0	0	1	0	1
千葉県	0	0	1	1	13
全国	6	6	28	45	142

※千葉県の令和７年件数は、６月２５日時点

※全国の令和７年件数は、国の感染症発生動向調査第２４週（６／９～６／１５）までの速報値

<参考>

1 千葉市における麻疹対策について

千葉市では、過去に麻疹ワクチン（混合ワクチンを含む）を接種していない方や、麻疹抗体検査の結果、抗体価が陰性の方などに予防接種の費用を助成しています。

（１）予防接種について

ア 対象者

千葉市に住民登録があり、次の①か②のどちらかに当てはまる方

①昭和４７年１０月２日以降生まれで、過去に麻疹ワクチン（混合ワクチンを含む）を１回も接種したことがない方

②昭和４７年１０月１日以前生まれで、麻疹抗体検査の結果、抗体価が低い方

イ ワクチンの種類 麻疹風疹混合ワクチン（MRワクチン）

ウ 自己負担額 無料

エ 助成回数 １人１回まで

※過去に千葉市の助成事業を利用して麻疹風疹混合ワクチンを接種されたことのある方は対象になりません。

（２）抗体検査について

希望される場合は直接近隣の医療機関へお問い合わせください。なお、抗体検査に係る費用は全額自己負担となります。

市内の麻疹風疹混合ワクチン予防接種協力医療機関や、申し込み方法等の詳細については千葉市ホームページをご確認ください。

○麻疹風疹混合ワクチン任意予防接種費用助成のご案内

【URL】https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/fushin_mashin_optional_r6.html



2 麻疹の症状

感染すると通常１０～１２日後に３８℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血などが約２～４日間続き、解熱後、再び３９℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者１，０００人に１人の割合で脳炎が発症すると言われており、死亡する割合は、先進国であっても１，０００人に１人と言われています。

3 感染経路

麻しんは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。麻しんウイルスの主たる感染経路は空気感染で、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症すると言われています。

また、発症した人が周囲に感染させる期間（感染可能期間）は、症状が出現する1日前から解熱後3日間までといわれています。

4 感染予防策

麻しんは予防接種が有効であり、2回定期接種の機会があります。

- ・第1期 1歳以上2歳未満
- ・第2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の1年間

また、麻しんを発症した場合、学校や職場等で感染を拡大させるおそれがあるため、母子手帳などで予防接種歴を確認し、定期予防接種を2回受けていない方や予防接種歴が不明な方は、かかりつけ医などに相談の上、接種を検討する必要があります。

なお、麻しんを疑う症状が現れた場合は、感染拡大を防止するため、事前に医療機関に電話連絡でその旨を伝え、医療機関の指示に従い受診してください。

また、受診時は、周囲への感染を防ぐため、公共交通機関等の利用を避ける必要があります。

5 潜伏期間

約10日～12日間（21日間程度の場合もあります。）

6 治療

特異的な根治療法はなく、対症療法を行います。

7 海外での感染症情報について

海外では、渡航先によっては様々な感染症が流行している場合があります。海外渡航の予定がある方は、厚生労働省検疫所のホームページ等で渡航先の感染症情報を確認するとともに、予防接種実施の検討等、適切な感染予防を心がける必要があります。

○厚生労働省検疫所ホームページ

【URL】 <https://www.forth.go.jp/index.html>

