


調査場所 千葉市祐光 1-25-3

標高 仮B.M. +0.800より -0.010 M

調査期間 自昭和54年9月 2日~至昭和54年9月 4日

水位 (自然・孔内) 1.35 M

現場担当者




調査場所 千葉市祐光 1-25-3

標高 +0.205M

調査期間 自昭和54年9月 1日~至昭和54年9月 3日

水位 (自然・孔内) 0.85M

現場担当者





ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立院内小学校他1校における設置地質調査他業務委託

事業・工事名

ボーリングNo	5	3	4	0	3	1	3	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シ - ト No

ボーリング名	No.1			調 査 位 置			千葉市中央区祐光1丁目25番3号他(千葉市立院内小学校)					北	緯	35° 36' 56.0000"			
発 注 機 関	千葉市都市局建築部営繕課						調 査 期 間		平成17年 6月 3日～平成17年 6月 6日				東	経	140° 07' 32.0000"		
調 査 業 者 名				主任技師			現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者			ボーリング責任者					
孔 口 標 高	K B M -0.03m		角  度	方  向	地盤勾配  配	使用機種	試 錐 機	カ/-KR-100			ハンマー落下用具		半自動型				
総 掘 進 長	30.35m						エ ン ジ ン	NS-75			ポ ン プ		V-6				

標 尺 m	標 高 m	層 厚 m	深 度 m	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		掘 進 月 日			
												深 度 m	10cm毎の打撃回数			打撃回数／貫入量	N 値	深 度 m	試 験 名 及 び 結 果	深 度 m		試 料 番 号	採 取 方 法	内 試 験
													0 1 10	10 20 20	20 30 30									
1	-1.13	1.10	1.10		埋土	茶黒褐			AS=60mm、碎石=120mm。ローム、粘土の混合土。コンクリート片及び木片、ガラ等多量混入。		6 / 4 0.90	1.15 1/15	1/15	2/30	2				1.15 P1	(P)	物理			
2	-2.53	1.40	2.50		砂質シルト	暗灰		軟い	含水分中位。粘性小位。 ごく少量の貝殻片混入。	SF		1.45 2.15 2.50	1/15	1	1	3/35	3				2.15 P2	(P)	粒度	
3					シルト質細砂	暗灰	緩い		含水分大位。 粒子不均一。 少量の腐植物混入。	S-F		3.15 3.45 4.15	1	1	1	3/30	3				3.15 P3	(P)	物理	
4												4.45 5.15 5.45	1	1	1	3/30	3				4.15 P4	(P)	粒度	
5	-4.83	2.30	4.80						含水分中位。 粒子不均一。 貝殻片多量混入。	SG-F		6.15 6.45 7.15	6	7	7	20/30	20				5.15 P5	(P)	粒度	
6					貝殻混り細砂	暗灰	中位					7.45 8.15 8.45	1	2	1	4/30	4				6.15 P6	(P)	粒度	
7	-7.03	2.20	7.00						含水分やや多い。 粒子均一。 シルト所々不規則に挟んで混入。	SF-G		9.15 9.50 10.15	1	2	2	5/30	5				7.15 P7	(P)	粒度	
8					シルト混り細砂	暗灰	緩い					10.55 12.15 12.50								8.15 P8	(P)	粒度		
9	-8.93	1.90	8.90						含水分やや多い。 粘性小位。 少量の砂及び貝殻片混入。			13.15 13.55 14.15	0			0/35	0			9.15 P9	(P)	粒度		
10												14.50 15.15 15.55								11.00 T11	(T)	物理力学圧密		
11									貝殻片やや多く混入。	MH-S		16.15 16.50 17.15	0			0/35	0			11.80 12.15 P12	(P)	粒度		
12									土粒子不均質。			17.45 18.15 18.45	0			0/30	0			12.50 13.15 P13	(P)	粒度		
13									貝殻片混入なくなり、やや粘土質となる。			19.15 19.45 20.15	0			0/40	0			13.55 14.15 P14	(P)	粒度		
14					シルト	暗灰	非常に軟い		含水多い。			20.45 21.15 21.45	0			0/35	0			14.50 15.15 P15	(P)	粒度		
15									粘性小位。			22.15 22.45	0			0/40	0			15.55 16.15 P16	(P)	粒度		
16									15.00m以深、含水分中位となる。	Fm		22.45								16.50				
17									粘性小位。											18.15 P18	(P)	粒度		
18									土粒子均質。			19.15 19.45 20.15	0			0/30	0			18.45				
19	-18.73	9.80	18.70						含水分中位。 粘性小位。 貝殻片多量混入。			20.45 21.15 21.45	1/15	1/15	2/30	2				19.15 P19	(P)	粒度		
20					砂質シルト	暗灰		非常に軟い		Cm		22.15 22.45	1/15	1/15	2/30	2				19.45 20.15 P20	(P)	粒度		
21	-21.03	2.30	21.00						含水分やや多い。 粒子不均一。 雲母少量混入。				2	1	2	5/30	5			20.45 21.15 P21	(P)	粒度		
22					シルト質細砂	暗灰	緩い			Cm										21.45				
23	-22.93	1.90	22.90																					

[illegible]